

【EC療法について】 (エピルピシン+エンドキサン)

お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
薬の名前	作用	時間																							
デキサート注	吐き気止め	15分																							
アロキシ注	吐き気止め																								
エピルピシン注	抗がん剤	2~5分																							
エンドキサン注	抗がん剤	30分																							
イメンドカプセル	吐き気止め	1日1回 内服																							
デカドロン錠	吐き気止め	朝 内服																							
ナウゼリンOD錠	吐き気止め	朝・昼・夕 内服																							
ジブレキサ錠	吐き気止め	寝る前 内服																							
酸化マグネシウム錠	便秘予防	朝・昼・夕 内服																							

尿が赤くなることがあります

この週はお休みです。

この週はお休みです。

5日目以降は吐き気がなければ中止

下痢時中止

治療による副作用

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
吐き気	出現時期																							
白血球減少	出現時期																							
脱毛	出現時期																							

心機能低下 (治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)

点滴をした日は、自動車、バイクなどの運転はお控えください。