














【TC療法について】 (ドセタキセル+エンドキサン)

お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
薬の名前	作用	時間																							
レスタミン錠	アレルギー予防	点滴前 内服	 5錠																						
デキサート注	アレルギー予防、吐き気止め	30分																							
グラニセトン注	吐き気止め																								
ドセタキセル注	抗がん剤	60分 (初回120分)																							
エンドキサン注	抗がん剤	30分																							
デカドロン錠	アレルギー予防、吐き気止め	朝 内服																							



この週はお休みです。











この週はお休みです。

5-6日は吐き気がなければ中止

治療による副作用

■ : 出現時期

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目		
アレルギー																								
下痢																								
皮疹 (皮膚炎、湿疹、あかぎれ)																								
筋肉痛・関節痛																								
白血球減少																								
脱毛																								

末梢神経障害 (治療回数が増えると生じることがあります。しびれ感などがありましたらお知らせ下さい。)

手や足のむくみ (治療回数が増えると生じることがあります。気になる症状がありましたらお知らせ下さい。)

点滴をした日は、自動車、バイクなどの運転はお控えください。