







【dose-dense AC療法について】  
 (アドリアシン+エンドキサン)

お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

				1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目	2	3	4		
薬の名前	作用	投与量	時間																				
デキサート注	吐き気止め	1.65mg/0.5mL 6.6 mg/2mL	30分																				
アロカリス注	吐き気止め	235mg/10mL																					
パロノセトロン注	吐き気止め	0.75mg/50mL																					
アドリアシン注	抗がん薬	60mg/m <sup>2</sup>	2~5分		尿が赤くなることがあります																		
生理食塩液		70mL																					
エンドキサン注	抗がん薬	600mg/m <sup>2</sup>	30分																				
生理食塩液		100mL																					
ジーラスタ注	白血球減少予防		皮下注射																				
ネキシウムカプセル	胃薬		朝 内服																				
ナウゼリンOD錠	吐き気止め		朝・昼・夕 内服																				
ジブレキサ錠	吐き気止め		夕 内服																				
酸化マグネシウム錠	便秘予防		朝・昼・夕 内服																				
バクタ錠	肺炎予防		朝 内服																				

治療による副作用

				1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目	2	3	4
吐き気																					
白血球減少																					
脱毛																					

心機能低下 (治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)

点滴をした日は、自動車、バイクなどの運転はお控えください。

当院は、一部の薬剤にジェネリック医薬品及びバイオシミラーを使用しています。