【TC療法について】
（ドセタキセル＋エンドキサン）

お薬の名前と治療のスケジュール（副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。）

薬の名前	作用	投与量	時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
レスタミン錠	アレルギー予防	5錠	点滴前　内服	💊																					💊
デキサート注	アレルギー予防、吐き気止め	1.65mg/0.5mL 6.6 mg/2mL	30分	💉																					💉
パロノセトロン注	吐き気止め	0.75mg/50mL																							
ドセタキセル注	抗がん薬	75mg/m^2	60分 （初回120分）	💉																					💉
5%糖液		250mL																							
エンドキサン注	抗がん薬	600mg/m^2	30分	💉																					💉
生理食塩液		100mL																							
ジーラスタ注	白血球減少予防		皮下注射		←→	💉																			
ジプレキサ錠	吐き気止め		夕　内服	💊	💊	💊																			
ネキシウムカプセル	胃薬		朝　内服		💊	💊	💊																		



治療による副作用

：出現時期



末梢神経障害（治療回数が増えると生じることがあります。しびれ感などがありましたらお知らせ下さい。）

手や足のむくみ（治療回数が増えると生じることがあります。気になる症状がありましたらお知らせ下さい。）

点滴をした日は、自動車、バイクなどの運転はお控えください。

当院は、一部の薬剤にジェネリック医薬品及びバイオシミラーを使用しています。

湘南記念病院　薬局